


NIBERAN®

30 tabl x 100 mg Nimesulide

Ισχυρότερο
από τον
Πόνο!



Nimesulide:

η Νιμεσουλίδη είναι ένα

Μη Στεροειδές Αντιφλεγμονώδες Φάρμακο
με αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες
που δρα ως ένας αναστολέας, του ενζύμου
της σύνθεσης των προσταγλανδινών
κυκλοοξυγενάση.



BALU
PHARMACEUTICALS

NIBERAN®

30 tabl x 100 mg Nimesulide

Ενδείξεις*:

Θεραπεία του οξέος πόνου, Συμπτωματική θεραπεία της επώδυνης οστεοαρθρίτιδας, Πρωτοπαθής δυσμηνόρροια.

Δοσολογία*:

100mg δύο φορές την ημέρα μετά φαγητού, με μέγιστη διάρκεια συνεχόμενης θεραπείας τις 15 ημέρες.

Αντενδείξεις*:

Γνωστή υπερευαισθησία στη Νιμεσουλίδη ή σε κάποιο από τα έκδοχα του προϊόντος, Βαριά καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια, Ηπατική ανεπάρκεια, Αγγειοεγκεφαλική αιμορραγία ή αιμορραγικές διαταραχές, Ενεργό ή υποτροπιάζων γαστρικό ή δωδεκαδακτυλικό έλκος.

Προειδοποιήσεις - Προφυλάξεις*:

Αποφυγή ταυτόχρονης χορήγησης ηπατοτοξικών φαρμάκων ή διαφορετικών ΜΣΑΦ, ή κατανάλωσης οινοπνεύματος.

Σημαντικές Ανεπιθύμητες Ενέργειες*:

Ζάλη, Ταχυκαρδία, Οίδημα, Υπέρταση, Καρδιακή ανεπάρκεια, Διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης, Διάρροια, Ναυτία, Έμετος, Γαστρίτιδα, Γαστρικό ή Δωδεκαδακτυλικό Έλκος ή Διάτρηση αυτών.

Συσκευασία*:

30 δισκία στρογγυλά, διχοτομούμενα, άοσμα. Καθέ δισκίο περιέχει 100mg Νιμεσουλίδης.

Βοηθείστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή:

Συμπληρώστε την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

(*: Data on file)

Αναφέρατε:

- Όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα **Νέα φάρμακα**
- Τις **ΣΟΒΑΡΕΣ** ανεπιθύμητες ενέργειες για τα **ΓΝΩΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ**



30^ο χλμ. Αθηνών-Λαυρίου, 190 03 Μαρκόπουλο (Αττικής) Μεσόγεια
Τηλ.: 22990 22 341-5, Fax.: 22990 22 347
www.medhel.gr, E-mail.: info@medhel.gr