



Διάλυμα ηλεκτρολυτών  
για ενυδάτωση και αντοχή



#### MED ELECTROLYTES

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, διόπι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες.

#### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το MED ELECTROLYTES είναι προϊόν ειδικής διατροφής για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς που χρησιμοποιείται για την από του στόματος αντιμετώπιση της αφυδάτωσης και την αποκατάσταση των χαμένων ηλεκτρολυτών που προκαλείται σε περιπτώσεις εμέτων και διάρροιας.

Περιέχει σε ιδιαίτερες αναλογίες δεξιτρόζη και άλατα (ηλεκτρολύτες) τα οποία αποκαθιστούν την διαταραγμένη οξειδιαστική ισορροπία κατόπιν απορροφήσεως. Η δεξιτρόζη βοηθά στην απορρόφηση τόσο του ύδατος όσο και των ηλεκτρολυτών από τον γαστρεντερικό σωλήνα.

Το MED ELECTROLYTES χορηγείται σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάζεται αποκατάσταση των υγρών και ηλεκτρολυτών όπως:

-Περιστατικά διάρροιας οποιασδήποτε αιτιολογίας και περιστατικά γαστρεντερικών διαταραχών συνοδεύομενα από διάρροια και εμετούς. Σε περιπτώση που η διάρροια ή ο έμετος επιμένουν πέραν των 48 ωρών επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας για τυχόν αλλαγή της θεραπευτικής αγωγής.

-Σε καταστάσεις υπερβολικής απώλειας υγρών λόγω άθλησης ή έντονης εργασίας

-Σε καύσωνα και υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος

- Σε καταστάσεις απώλειας υγρών από κατανάλωση αλκοόλης. Στις περιπτώσεις αυτές η δοσολογία καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του περιστατικού.  
-Σε καταστάσεις αφυδάτωσης λόγω πυρετού.

**ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Το περιεχόμενο ενός φακελάκιου διαλύεται σε 200 ml νερού με την βοήθεια ελαφριάς ανάδευσης και το προκύπτον διαυγές διάλυμα πίνεται όλο ή σε μικρές διαδοχικές ποσότητες. Τα διαλύματα MED ELECTROLYTES καταναλώνονται φρέσκα εντός διαστήματος 24 ωρών αλλιώς απορρίπτονται.

**MED ELECTROLYTES** διαλύεται μόνο σε νερό και όχι σε γάλα ή χυμούς φρούτων.

#### ΣΥΝΘΕΣΗ:

Sodium chloride, Potassium chloride, Monosodium citrate, Glucose monohydrate, Flavour, Aspartame

#### Περιεκτικότητα σε mEq/lit

Na <sup>+</sup>	39
Cl <sup>-</sup>	38
K <sup>+</sup>	17
Glucose	
monohydrate	114
Monosodium	
Citrate	17.5

#### Περιεκτικότητα σε mg/sachet

NaCl	250
Glucose monohydrate	4526.5
Monosodium citrate	300
KCl	250
Aspartame	25
Flavour	60

#### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

Βρέφο (έως 2 ετών)

Χορήγηση κατόπιν υπόδειξης και επίβλεψης παιδιάτρου.

Σε καταστάσεις ήπιας/μέτριας αφυδάτωσης χορηγούνται 75ml ανά κιλό σωματικού βάρους, σταδιακά, σε διάστημα 4-6 ωρών. Αναλυτικά, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.

#### ΔΙΑΡΡΟΙΑ-ΕΜΕΤΟΣ:

**ΕΝΗΛΙΚΕΣ:** 1-2 φακελάκια μετά από κάθε κένωση.

**ΠΑΙΔΙΑ (άνω των 2 ετών):** 1 φακελάκι μετά από κάθε κένωση.

Στον εμετό, το διάλυμα χορηγείται σταδιακά (1 κουταλάκι γλυκού κάθε 3-4 λεπτά).

**ΒΡΕΦΗ (3μηνών έως 2ετών):** χορήγηση μόνο κατόπιν υπόδειξης και επίβλεψης γιατρού.

**ΑΘΛΗΣΗ:** Μέγιστη ημερήσια δόση: 5 φακελάκια MED ELECTROLYTES.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ-ΚΑΥΣΩΝΑ:** Να χορηγείται προληπτικά σε άτομα που ιδρώνουν υπερβολικά.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΥΡΕΤΟΥ:** Η δοσολογία καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**

Το **MED ELECTROLYTES** χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και πάνω, αλλά και σε βρέφη κάτω των 2 ετών. Σε περιπτώση χορήγησης σε βρέφη 3 μηνών έως 2 ετών απαιτείται υποχρεωτικά η επιβλεψη γιατρού. Σε περιπτώση χορήγησης σε βρέφη το νερό πρέπει πρώτα να έχει βράσει, να ψυχθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και κατόπιν να διαλυθεί το περιεχόμενο του φακελίσκου.

Το **MED ELECTROLYTES** δεν πρέπει να χορηγείται:  
Σε περιπτώσεις βαριάς νεφρικής ανεπάρκειας, απόδραξης ή διάτρησης του εντέρου, υπερκαλιαιμικές καταστάσεις οποιασδήποτε αιτιολογίας.

Το **MED ELECTROLYTES** χορηγείται με προσοχή :  
Σε περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας, αυξημένης αρτηριακής πίεσης, διαταραχής αποβολής του καλίου από τους νεφρούς, δίαιτας χαμηλής περιεκτικότητας σε αλάτι.

**Το προϊόν αυτό περιέχει γλυκόζη και η χορήγηση σε διαβητικούς θα πρέπει να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού.**

**ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ:**  
Χορηγείται μόνο κάτω από την σύμφωνη γνώμη του γιατρού.

Το **MED ELECTROLYTES** φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη των 25 C.

Αρ. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα για την

**BALU A.E. Φάρμακα & Καλλυντικά**

30ο χμ λεωφ. Αθηνών-Λαυρίου,  
190 03 Μαρκόπουλο, Μεσόγεια, Αττική  
T: 22990 22341-5 F: 22990 22347-8  
www.medhel.gr info@medhel.gr